

令和7年4月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「トアロー水和剤CT」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「トアロー水和剤CT」が令和7年4月23日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : トアロー水和剤CT (第14459号)
有効成分・% : バチルス チューリングレンシス菌の産生する結晶毒素 …………… 7.0%

登録年月日 : 令和7年4月23日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更:

- ・ 作物名「たばこ」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加する。

【変更後】 (変更する作物のみ抜粋)

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | BTを含む農薬の総使用回数 |
|-----|---------|------------|-----------------|-----------------------|---------|------|---------------|
| たばこ | アオムシ | 1000~2000倍 | 25~180 L/10a | 発生初期 但し収穫3 日前まで | 4回以内 | 散布 | — |
| | ヨトウムシ | 500~1000倍 | | | | | |
| | ハスモンヨトウ | 500倍 | | | | | |

<2>注意事項等の変更

なし

以上

【変更後】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | BTを含む農薬の総使用回数 |
|------------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------|---------|------|---------------|
| 飼料用とうもろこし | アワノメイガ | 1000倍 | 100～300L/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | — | 散布 | — |
| 雑穀類 (ひえを除く) | | 500～1000倍 | 60～150L/10a | | | | |
| ひえ | イネヨトウ | | 1000倍 | | | | |
| 野菜類 (パセリ、えごま(葉)を除く) | ヨトウムシ | 500～1000倍 | 100～300L/10a | | | | |
| | アオムシ コナガ | 1000～2000倍 | | | | | |
| パセリ | ハスモンヨトウ | 500倍 | | | | | |
| | ヨトウムシ | 500～1000倍 | | | | | |
| えごま(葉) | アオムシ コナガ | 1000～2000倍 | | | | | |
| | ベニフキノメイガ | 1000倍 | | | | | |
| えごま(種子) | | | | | | | |
| 果樹類 (りんごを除く) | ハマキムシ類 | 500～1000倍 | 200～700L/10a | 発生初期 但し摘採7日前まで | — | — | |
| りんご | ヒメシロモンドクガ | | | | | | |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシヤク | | 200～400L/10a | | | | |
| たばこ | アオムシ | 1000～2000倍 | 25～180L/10a | 発生初期 但し収穫3日前まで | 4回以内 | — | |
| | ヨトウムシ | 500～1000倍 | | | | | |
| | ハスモンヨトウ | 500倍 | | | | | |
| 樹木類 (つばき類を除く) | アメリカシロヒトリ | 1000～2000倍 | 200～700L/10a | 発生初期 | — | — | |
| | イラガ類 | 1000倍 | | | | | |
| つばき類 | アメリカシロヒトリ | 1000～2000倍 | | | | | |
| | イラガ類 | 1000倍 | | | | | |
| | チャドクガ | | | | | | |
| ストック | コナガ | | 100～300L/10a | | | | |